

PAMIĘTAJ:

Retinopatia cukrzycowa jest groźnym powikłaniem cukrzycy, które powstaje w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki w tylnej części oka i doprowadza do nieodwracalnej ślepoty.

- Wczesne wykrywanie zmian cukrzycowych na dnie oka i kierowanie chorych na leczenie we właściwym czasie pozwala zminimalizować negatywny wpływ cukrzycy na narząd wzroku.
- Wszyscy chorujący na cukrzycę Pacjenci powyżej 12 roku życia niezależnie od sposobu leczenia cukrzycy (insulina, tabletki, dieta) i bez względu na to, czy leczenie cukrzycy prowadzone jest przez lekarza pierwszego kontaktu czy też specjalistę diabetologa, powinni poddawać się obowiązkowym, regularnym badaniom okulistycznym.

Zmiany spowodowane retinopatią cukrzycową są zazwyczaj niezauważalne przez chorego aż do momentu, gdy choroba jest już znacznie zaawansowana.

RETINOPATIA CUKRZYCOWA

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIA

Okresowe, regularne badania okulistyczne, obejmujące analizę dna oka przy rozszerzonej źrenicy oraz sfotografowanie siatkówki, mogą pozwolić na wykrycie w odpowiednim czasie zmian, które grożą utratą wzroku.