

JASKRA

JEŻELI:

- w Twojej rodzinie występowały przypadki Jaskry
- masz podwyższony poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego
- cierpisz na krótkowzroczność (powyżej -4 dioptrii)
- masz asymetrię w budowie tarczy nerwu wzrokowego
- przewlekłe stosowałeś sterydy (w tym sterydy w postaci kropli do oczu)
- masz niskie ciśnienie krwi lub zbyt intensywnie leczone nadciśnienie
- leczysz się na cukrzycę
- masz ponad 35 lat
- żyjesz w stresie
- masz zaburzenia krążenia obwodowego, tj. zimne stopy i dłonie
- masz zaburzenia gospodarki tłuszczowej

PAMIĘTAJ:

JASKRA niszczy wzrok bez ostrzeżenia. Zbyt późno rozpoczęte leczenie może już nie powstrzymać całkowitej utraty wzroku! Tylko specjalistyczne badania diagnostyczne są w stanie wysledzić początki zmian jaskrowych!

JASKRA

JASKRA to schorzenie oczu, które doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego. W jaskrze dochodzi do powstawania ubytków w polu widzenia w skutek zaniku włókien nerwu wzrokowego, a w ostateczności do całkowitej utraty wzroku.

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIA

PAKIET BADAŃ **PODSTAWOWYCH** obejmuje:
Perymetria (pole widzenia),
Pachymetria (grubość rogówki),
Tonometria (ciśnienie w oku),
GDX (ocena grubości włókien nerwowych siatkówki),
Konsultacja Specjalisty

PAKIET BADAŃ **ROZSZERZONYCH** obejmuje:
Perymetria (pole widzenia),
Pachymetria (grubość rogówki),
Tonometria (ciśnienie w oku),
OCT tarczowe (Optyczna Koherentna Tomografia),
Konsultacja Specjalisty